

HER2 陰性乳癌に対する周術期薬物療法

宮崎大学 呼吸器・乳腺外科

富永洋平

設問 1

- 健康状態に問題のない閉経後女性（60歳）のHER2陰性ER陽性乳癌患者。
- Bt+Ax 浸潤径は4cm HG II Ki67は18%リンパ節転移は3個。
- オンコタイプDXの再発スコアは35だった。

- 術後化学療法の方針は？

設問 2

- 健康状態に問題のない閉経後女性（60歳）のHER2陰性ER陽性乳癌患者。
- Bt+Ax 浸潤径は4cm HG II Ki67は18%リンパ節転移は3個。
- オンコタイプDXの再発スコアは35だった。
- 第3度の近親者内に卵巣がんの家族歴を有する。
- 生殖細胞系列*BRCA1/2*は野生型だった。

- 術後内分泌療法及び併用する薬剤の方針は？

設問 3

- 健康状態に問題のない閉経後女性（60歳）のHER2陰性ER陽性乳癌患者。
- Bt+Ax 浸潤径は4cm HG II Ki67は18%リンパ節転移は3個。
- オンコタイプDXの再発スコアは35だった。
- 第3度の近親者内に卵巣がんの家族歴を有する。
- 生殖細胞系列 *BRCA2* に病的バリエーションを認められた。

- 術後内分泌療法及び併用する薬剤の方針は？